



**Bayfolan<sup>®</sup>**  
ALGAE

## /// La mejor Estrategia para Post Cosecha en Huertos de Cerezos

### /// PRINCIPALES VENTAJAS

- // Mejora condición general de la planta.
- // Evita y ayuda a salir de stress bióticos y abióticos.
- // Para protección de follaje y madera contra golpe de sol, aplicar en mezcla con bloqueador solar *WallSun (MR)*.
- // Extracción natural de *Ascophyllum nodosum* proveniente del Atlántico Norte.
- // Formulación Gel Hidrosoluble con mayor adherencia y absorción.
- // Excelente compatibilidad con productos Fitosanitarios y Fitoreguladores.

#### Recomendaciones de uso Bayfolan<sup>®</sup> Algae

Cultivo	Dosis
Frutales y Vides	2,5 - 4,0 L/ha



**envidor<sup>®</sup>**

### /// PRINCIPALES VENTAJAS

- // Nuevo grupo químico para el control de arañas fitófagas.
- // Controla todos los estados de desarrollo de los ácaros (huevos, larvas, ninfas y adultos).
- // Muy buena selectividad a abejas e insectos benéficos, ideal para MIP.
- // Amplio espectro de control.
- // Excelente herramienta para el manejo anti-resistencia.
- // Presenta prolongado efecto de control y protección.
- // Excelente perfil medioambiental.

#### Recomendaciones de Uso Envidor<sup>®</sup>

Cultivo	Concentración	Plaga	Observaciones
Cerezos	50 - 60 cc / 100 L de agua	Araña roja europea	Volúmenes de agua a utilizar, en L/ha: frutales de carozo entre 1.500 y 2.500. En casos particulares de huertos que presenten una mayor canopia, aumentar los volúmenes de agua a aplicar hasta punto de goteo, mantener la concentración indicada. Por tratarse de un producto de contacto, para lograr un óptimo control se requiere de completa cobertura de las partes infestadas. Privilegiar siempre un buen cubrimiento de la canopia a tratar.
		Araña binaculada	
		Falsa araña roja de la vid	
		Araña parda de los frutales	

Para mayor información, le invitamos a entrar a nuestro sitio [www.cropscience.bayer.cl](http://www.cropscience.bayer.cl)

