Catálogo 2022

Soluciones Integrales para **Cereales de Invierno**

Soluciones Integrales / Cereales de Invierno



CLIMATE FIELDVIEW
IMPULSO Bayer
EN TODO MOMENTO

ROUNDUP TOP

HERBICIDA

Propósito

Herbicida no selectivo para el control post emergente de malezas anuales y perennes (tanto gramíneas como latifoliadas) de acción sistémica. Es absorbido por hojas y tejidos verdes y traslocado hacia las raíces, órganos vegetativos subterráneos y tejidos foliares en crecimiento provocando la muerte de las malezas.

Posicionamiento

Producto que puede ser utilizado en **barbecho químico, pre siembra** (cereales de invierno, girasol, sorgo, maíz, algodón y soja) en **post emergencia** de cultivos tolerantes a glifosato (maíz, soja y algodón) siempre respetando o atentos a la ventana de aplicación conforme registro.

Fortalezas

1 | Producto **más concentrado** del segmento líquido (575 g equivalente ácido/l; 705 g de sal de potasio de glifosato).

2 | Producto con la mayor concentración de surfactante del mercado con tecnología **Transorb II** que garantiza el control consistente de malezas a través de distintas condiciones (garantía total).

3 | Versatilidad en el momento de aplicación pudiendo utilizarse en **barbecho y en post emergencia** de cultivos tolerantes a glifosato.

4 | **Sustentabilidad**: unificación del color de envase (Blanco) que permitirá facilitar su recolección sin necesidad de segregación, a la vez de posibilitar su reutilización en bidones con material recuperado. La mayor concentración (vs formulaciones 480, 506, etc) implica una reducción en el uso de bidones por hectárea, disminuyendo el uso de plástico. Disponible en formato bidón 20 Lts e IBC retornable 1000 Lts.

LATIUM SUPER

HERBICIDA

Propósito

Herbicida para el control post emergente de malezas gramíneas anuales y perennes de acción sistémica, utilizado en barbecho o en cultivos de dicotiledóneas.

Posicionamiento

Latium Super 36 EC (Cletodim 360)

Producto que puede ser utilizado en barbecho químico, respetando período de restricción según dosis aplicada a cereales de invierno y maíz, y en post emergencia (de cultivos tales como girasol, soja, algodón, papa) respetando el momento de aplicación.

Dosis 330 a 670cc/ha, según tamaño y cantidad de macollos de la maleza gramínea a controlar.

Fortalezas

Herbicida graminicida por excelencia, con una marcada eficacia en **Rye Grass** así como también gramíneas primavera estivales.

Mayor concentración del mercado que otros graminicidas con el mismo activo.

CHUCARO

TRATAMIENTO DE SEMILLAS

Propósito

Lograr un **cultivo sano desde la emergencia**, protegiéndolo de enfermedades que provengan de la semilla, como así también de rastrojo, y gusanos de suelo y pulgones en estadíos vegetativos del cultivo.

Patógenos

- Carbón volador (*Ustilago nuda*)
- Carbón cubierto (*Tilletia caries*)
- *Fusarium sp.*
- Mancha amarilla del trigo (*Dreschlera tritici*) de semilla y rastrojo.
- Mancha en red de la cebada (*Dreschlera teres*) de semilla y rastrojo.
- Insectos
- Complejo de gusanos blancos
- Pulgones de los cereales.

Posicionamiento

Chucaro 330FS (Prothioconazole 37,5gr/lt + Fluoxastrobin 37,5 lt/ha + Tebuconazole 5gr/lt +Clothianidin 250 gr/lt).

Terápico de semilla para aplicar a la semilla en dosis de 125 a 150cc/100 kilos de semilla.

Fortalezas

Terápico de semilla que combina tres ingredientes activos que brindan una **protección muy completa**. Excelente sinergismo entre las moléculas fungicidas, sumando un potente neonicotinoide que protege a la semilla y plántula de ataques de gusanos blancos y pulgones.

Efecto de **promotor de crecimiento**, mayor vigor desde la emergencia. Permite desarrollar una importante cabellera radicular.

SCENIC

TRATAMIENTO DE SEMILLAS

Propósito

Lograr un **cultivo sano desde la emergencia**, protegiéndolo de enfermedades que provengan de la semilla, como así también de rastrojo.

- Carbón volador (*Ustilago nuda*)
- Carbón cubierto (*Tilletia caries*)
- *Fusarium sp*.
- Mancha amarilla del trigo (*Dreschlera tritici*) de semilla y rastrojo.
- Mancha en red de la cebada (*Dreschlera teres*) de semilla y rastrojo.

Posicionamiento

Scenic 80FS (Prothioconazole 37,5gr/lt + Fluoxastrobin 37,5 lt/ha + Tebuconazole 5gr/lt).

Terápico de semilla para aplicar a la semilla en dosis de 125 a 150cc/100 kilos de semilla.

Fortalezas

Terápico de semilla que combina tres ingredientes activos que brindan una **protección muy completa** con un excelente sinergismo entre los mismos.

Brinda una protección frente a **enfermedades provenientes de rastrojo** en estadíos muy tempranos del cultivo.

Otorga **velocidad** de emergencia.

PUCARA

TRATAMIENTO DE SEMILLAS

Propósito

Lograr un **cultivo sano desde la emergencia**, protegiéndolo de enfermedades que provengan de la semilla.

» Carbón volador (*Ustilago nuda*)
» Carbón cubierto (*Tilletia caries*)
» *Fusarium sp*.
» Mancha amarilla del trigo (*Dreschlera tritici*)
» Mancha en red de la cebada (*Dreschlera teres*)

Posicionamiento

Pucará 400 FS (Prothioconazole 250gr/lt + Tebuconazole 150 gr/lt).

Terápico de semilla para aplicar a la semilla en dosis de 15 a 20 cc/100 kilos de semilla.

Fortalezas

A la fortaleza del triazolinthión, prothioconazole se le suma la ya conocida performance del tebuconazole.

Baja dosis de ingrediente activo cada 100 kilos de semilla. Posee acción similar a un **promotor de crecimiento**.

PUMA EXTRA

HERBICIDA

Propósito

Puma Extra es un herbicida graminicida post emergente específico para el control de Avena Fatua.

Controles muy efectivos de Avena Fatua en diferentes estadíos fenológicos.

» Principio Activo
Fenoxaprop p etil + Mephenpyr diethil (safener).

Posicionamiento

Post-emergente del cultivo de cebada, con **alta selectividad** debido a la muy buena performance de su safener.

Por su formulación no requiere de aceites ni coadyuvantes. Acción de contacto y sistémica.

Momento de Uso: Post emergencia temprana del cultivo, hasta principios de elongación – **Dosis**: 800 a 1000cc/ha

Umbral de Acción: Avena fatua desde 2 hojas hasta fin de macollaje.

Fortalezas

Es altamente selectivo para el cultivo de cebada.

Puma Extra cuando llega al suelo se degrada biológicamente por acción de los microorganismos. No representa un riesgo para cultivos posteriores.

HUSSAR PLUS

HERBICIDA

Propósito

Es el único herbicida para **control de Rye Grass, Avena fatua y malezas de hoja ancha** en los cultivos de trigo y cebada.

Posicionamiento

Cultivo »
Desde 2 hojas a Fin de Macollaje, siendo lo óptimo desde 2 hojas a inicio de macollaje.

Maleza Gramínea »
Primer hoja a Inicio Macollaje.

Maleza Latifoliada »
Primer par de hojas a segundo par de hojas.

Dosis: 220 a 240 cc/ha Hussar Plus + 5g/ha Metsulfurón 60% + coadyuvante Hussar al 0,2%v/v.

Fortalezas

- » **Control** de Rye Grass, Avena fatua y malezas de hoja ancha.
- » **Dualidad de Cultivos**: Cebada y Trigo
- » **One Pass**: Control post-emergente de las malezas gramíneas y hojas anchas en una sola pasada.
- » Excelente **selectividad**.
- » La mejor relación **costo/beneficio**.

DECIS FORTE

INSECTICIDA

Propósito

Insecticida para uso foliar en el control de lepidópteros en cereales de invierno.

» Oruga desgranadora (*Faronta albilínea*)
» Oruga militar verdadera (*Pseudaletia adultera*)

Posicionamiento

Deltametrina 10 EC

Al observar los primeros ataques con tamaños de isocas en estadíos larvales jóvenes.

Dosis: 40cc/ha.

Fortalezas

Alto poder de volteo. **Mayor porcentaje de eficacia** con individuos en estadíos larvales chicos.

Baja cantidad de ingrediente activo por ha. Respeta benéficos.

Posee **registro en varios cultivos** así como también en varias plagas.

CRIPTON

FUNGICIDA

Propósito

Trifloxistrobin 15% + Prothioconazole 17,5%

Amplio espectro de control de enfermedades con efecto residual y aporte de vigor a las plantas. Producto Banda Verde. La evolución en protección.

Trigo

» Mancha amarilla (*Dreschlera tritici-repentis*)
» Roya anaranjada (*Puccinia triticina*)
» Septoriosis de la hoja (*Septoria tritici*)
» Roya amarilla (*Puccinia striiformis*)
» Roya negra o del tallo (*Puccinia graminis*)

Cebada

» Mancha en red (*Dreschlera teres*)
» Roya de la hoja (*Puccinia hordei*)
» Escaldadura (*Rhynchosporium secale*)
» Mancha Borrosa (*Bipolaris sorokiniana*)
» Ramularia o Salpicado necrótico (*Ramularia collocygni*)

Posicionamiento

Aplicaciones ante la aparición de los primeros síntomas llegando al umbral para las diferentes enfermedades en condiciones de buen potencial de rendimiento, cultivares susceptibles y condiciones climáticas favorables para el desarrollo de las enfermedades.

Trigo » Se recomienda aplicar con 5% de incidencia en royas y 20 a 30% de incidencia para manchas foliares.

Cebada » Se recomienda la aplicación cuando se llega al umbral de 20% de incidencia en manchas. Para el caso de Ramularia aplicar ante la aparición de las primeras manchas en hojas basales cuando la condición ambiental es predisponente para el desarrollo de la enfermedad.

Dosis en aplicaciones terrestres: Cripton 500 - 700ml/ha + Optimizer 300ml/ha con caudales entre 100 y 150 L/ha.

Dosis en aplicaciones aéreas: Cripton 500 - 700 ml/ha + Optimizer 500ml/ha con caudales entre 20 y 25 L/ha.

Fortalezas

1 | **Actúa rápidamente sobre el sitio objetivo.**

2 | **Detiene rápidamente el avance de los hongos.** Las plantas permanecen verdes por más tiempo, aumentando el área foliar remanente, de manera de llegar más "seguros" al momento de la cosecha.

3 | **Con registro en soja, maíz y maní.**

Mayor eficacia en el control »
Debido a que combina una Estrobilurina con el potente Prothioconazole.

Control de enfermedades »
Amplio espectro de control de enfermedades.

Banda verde »
Es más amigable con el ambiente y el usuario.

CRIPTON XPRO

FUNGICIDA

Propósito

Tecnología Xpro de Bayer, una poderosa solución fungicida para cereales basada en la complementariedad y sinergismo de sus tres ingredientes activos.
Trifloxistrobin 15% + Prothioconazole 17,5% + Bixafen 12,5%.

La última generación en fungicidas. Solución que otorga el más completo y prolongado cuidado del cultivo que potencia el rendimiento.

Control de enfermedades en Trigo

» Mancha amarilla (*Dreschlera tritici-repentis*)
» Roya anaranjada (*Puccinia triticina*)
» Septoriosis de la hoja (*Septoria tritici*)
» Roya amarilla (*Puccinia striiformis*)
» Roya del tallo (*Puccinia graminis*)

Control de enfermedades en Cebada

» Mancha en red (*Dreschlera teres*)
» Roya de la hoja (*Puccinia hordei*)
» Escaldadura (*Rhynchosporium secale*)
» Mancha Borrosa (*Bipolaris sorokiniana*)
» Ramularia o Salpicado necrótico (*Ramularia collocygni*)

Posicionamiento

Aplicaciones ante la aparición de los primeros síntomas llegando al umbral para las diferentes enfermedades en condiciones de buen potencial de rendimiento, cultivares susceptibles y condiciones climáticas favorables para el desarrollo de las enfermedades.

Trigo » Se recomienda aplicar con 5% de incidencia en royas y 20 a 30% de incidencia para manchas foliares.

Cebada » Se recomienda la aplicación cuando se llega al umbral de 20% de incidencia en manchas. Para el caso de Ramularia aplicar ante la aparición de las primeras manchas en hojas basales cuando la condición ambiental es predisponente para el desarrollo de la enfermedad.

Dosis en aplicaciones terrestres: Cripton Xpro 500 - 700ml/ha + Optimizer 300ml/ha con caudales entre 100 y 150 L/ha.

Dosis en aplicaciones aéreas: Cripton Xpro 500 - 700 ml/ha + Optimizer 500ml/ha con caudales entre 20 y 25 L/ha.

Fortalezas

1 | **Eficacia superior:** Triple mezcla está compuesta por la nueva generación de Carboxamidas “Bixafen”, sumado al único triazolinthion del mercado, “Prothioconazole”, y nuestro ya reconocido “Trifloxistrobin”.

2 | El resultado es un **control** inigualable y duradero de las principales enfermedades de cereales con un impacto fisiológico positivo en la planta, que ayuda a maximizar el rendimiento a campo.

» **Menor riesgo de resistencia**, por combinar tres modos de acción diferentes.

» **Mayor aprovechamiento de los activos**, gracias a la nueva formulación LEAFSHIELD.

» **Aumenta la eficiencia fotosintética** de la planta ante situaciones de estrés.

3 | **Registro en: soja maní y maíz.**

4 | **Único fungicida triple mezcla banda azul.**

BAYER