

FUNGICIDAS

PRODUCTO	PROBLEMA	DOSIS O CONCENTRACIÓN	RECOMENDACIÓN
Nativo 300 SC	Oídio de la Vid (Oidium tuckeri)	50 cc/100 Litros de agua	Iniciar los tratamientos con brotes de 10-20 cm, repitiendo cada 15 a 20 días de acuerdo a la necesidad. Utilizar no menos de 500 cm ² /ha. No reiterar las aplicaciones por más de tres veces. Alternar con productos de diferente modo de acción. Tiempo de carencia: 12 días.
Teldor 50% WP	Podredumbre gris de la Vid (Botrytis cinérea)	1,2 kg/ha Litros de agua	De acuerdo a las condiciones predisponentes reinantes, se recomiendan aplicaciones en floración, cierre de racimo y envero para luego y, en caso de ser necesario, hacer aplicaciones adicionales según las condiciones antes mencionadas. Tiempo de carencia: 3 días.
Serenade ASO	Botrytis y P. ácida	4 a 6 lts/ha	Fungicida y bactericida biológico. Aplicar en período cercano a la cosecha en alternancia con otros fungicidas de diferente modo de acción. No deja residuos en la cosecha ni en el vino. Tiempo de carencia: 0 día.

INSECTICIDAS

PRODUCTO	PROBLEMA	DOSIS O CONCENTRACIÓN	RECOMENDACIÓN
Movento 150 OD	Cochinilla harinosa Pulgones	70 a 90 cc/100 lts. de agua	Momento de aplicación: Aplicar preferentemente en forma temprana entre el período de floración a cuaje, cuando se producen las migraciones de las ninfas móviles hacia la base de los pitones y brotes nuevos. Se recomienda la mayor dosis para las variedades más tardías, a fin de lograr la residualidad necesaria. Tiempo de carencia: 21 días.

HERBICIDAS

PRODUCTO	PROBLEMA	DOSIS O CONCENTRACIÓN	RECOMENDACIÓN
Alion 500 SC	Malezas anuales y gramíneas, bianuales en etapa de germinación y malezas perennes provenientes de semillas.	70 a 90 cc/100 lts. de agua	Herbicida residual. Aplicar previo a la emergencia de malezas, o con malezas pequeñas recién emergidas en mezcla con Sitrin u otro.
Round up 66,2 CS	Malezas anuales, bianuales y perennes en post-emergencia.	2,0 - 4,0 L/ha	Herbicida de post-emergencia no selectivo. Evitar derivas hacia el follaje de los frutales.

Más información en
www.cropscience.bayer.com.ar



BAYER S.A., CUIT 30-50381106-1, con domicilio en Ricardo Gutierrez 3652, Munro, Provincia de Buenos Aires. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA.



PROGRAMA FITOSANITARIO

VINO





NATIVO

TELDOR

SERENADE ASO*

MOVENTO

Alion

Roundup

FUNGICIDAS



Oídio ó Peste ceniza

Botrytis ó Pudrición gris

INSECTICIDAS



Cochinilla harinosa
Pulgones

HERBICIDAS



Herbicida residual. Controla malezas gramíneas y hoja ancha, anuales, bianuales y perennes, provenientes de semilla.

Glyfosato, herbicida no selectivo para complementar el programa de control de malezas en el viñedo.

VIDA

*En proceso de registro SENASA